


かゆみを伴う乾燥肌の治療薬 (販売名) 近江兄弟社メンタームEXプラス

乾燥性皮膚や乾皮症などの皮膚病は、がまんできない不快なかゆみを伴います。空気の乾燥する冬場、入浴後や就寝時の体が暖まった時などにかゆみがひどくなるのが特徴で、かくとますますかゆくなり悪化してしまいます。近江兄弟社メンタームEXプラスは、かゆみ止め成分・ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカインがすばやくかゆみを抑えます。さらに、保湿成分・尿素が、かゆみやカサカサの原因である乾燥肌を治療してかゆみの悪循環を断ち切り、なめらかでみずみずしい肌へ導きます。



■ 乾燥性皮膚のこんな症状に

がまんできない!



小児の乾燥性皮膚

かゆくてイライラ!



老人の乾燥性皮膚

肌がカサカサ



成人の乾燥性皮膚

眠れない!



体が暖まるとかゆい!
(→裏面に続きます。)

⚠ 使用上の注意

× してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】
次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)傷口又は赤くはれているところ (3)ただれやひび割れのひどいところ



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

次の注意事項を守ってください

- 定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量【100g中に次の成分を含みます。】

成分	分量	働き	添加物として、ステアリルアルコール、セタノール、セバシン酸ジエチル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタンステアレート、プロピレングリコール、2,2',2''-トリロトリエタノール、カルボキシニルポリマー、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有する。
尿素	10.0g	角質の水分保持機能を高め、乾燥した肌をしっとりさせます。	
d-カンフル	1.0g	皮膚の血行を促進します。	
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	皮膚のかゆみをもとからおさえ、しずめます。	
リドカイン	2.0g	皮膚のかゆみの伝わりを止め、しずめます。	
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	皮膚の血行を促進します。	

保管及び取り扱い上の注意

- (1)高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135

※受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

(フリダイヤル) 0120-149-931