

第2類医薬品

虫さされ・かゆみに 鎮痒消炎薬
(販売名) 近江兄弟社メンタームベンソールH

[特長]

- 本剤は、アルコール等を基剤とする透明の液体で、患部に軽く塗布するだけで爽快感を与え、皮膚へのなじみもよく、速やかに乾燥し、べつつかず衣服をよぎしません。
- 本剤は、ステロイド成分、着色剤、保存剤、界面活性剤、アンモニアを含んでおりません。

[効能・効果]

- 虫さされ●かゆみ●しみやけ●じんましん
- 湿疹●皮膚炎●ただれ●あせも●かぶれ

[用法・用量] 1日数回患部に適量塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1~2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (5) 本剤は外用にのみ使用してください。

[成分・分量] 100mL中に次の成分を含みます。

成分	分量	働き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	0.3g	局所麻酔作用により、知覚神経を麻痺させ、かゆみを緩和します。
dl-カンフル	3.0g	鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みや、かゆみをやわらげます。
I-メントール	5.0g	
グリチルレチン酸	0.3g	生薬由来成分で、抗炎症作用、抗アレルギー作用を有し、炎症を抑えます。

添加物として、エタノール、プロピレングリコールを含有する。

△[使用上の注意]

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる次の部位には使用しないでください。

創傷面、目の周囲、粘膜等。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お問合せ先

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室

TEL: 0748-32-3135

受付時間: 午前8:30~午後5:30
(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問合せ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 使用前にスポンジ部分を容器正立状態で軽く押して内圧を下げるから使用してください。(中の空気が抜け液の出過ぎを防ぎます)。使用後は必ずキャップを十分にしめてください。

(2) 高温・直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。

(4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(5) 火気に近づけないでください。

(6) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化織製品、皮革製品、床や家具などの塗装表面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。

(7) 本剤のついた手で目等の粘膜にふれないでください。

(8) 使用期限を過ぎた製品は使しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

容量 70mL

製造販売元

株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29